

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA
W KRAKOWIE
ODDZIAŁ W MIECHOWIE**

ul. Konopnickiej 23a; 32-200 Miechów, tel.(o41) 38-322-05

www.piorin.gov.pl/krakow, e-mail:o-miechow@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT z dnia 13.06.2008r.

O ZWALCZANIU LARW STONKI ZIEMNIACZANEJ.

Na plantacjach ziemniaków masowo występują larwy stonki ziemniaczanej w stadium najbardziej odpowiednim do zwalczania. Należy wykonać zabieg jednym z następujących preparatów:

ACTAR 25 WG

APACZ 50 WG

BULLDOCK 025 EC

CALYPSO 480 SC

DECIS 2,5 EC

DECIS PROTECH 015 EW

DECISTAB TB

ENDURO 258 EC

FASTAC 100 EC

FURY 100 EW

KARATE ZEON 050 CS

MARSHAL 250 CS

MOSPILAN 20 SP

NOMOLT 150EC

NURELLE D 550 EC

NURELLE MAX 515 EC

PATRIOT 100 EC

PATRIOT 2,5 EC

PROAGRO 100 SL

RAPID 060 CS

RIPCORDER SUPER 050 EC

SHERPA 100 EC

SUMI-ALPHA 050 EC

UWAGA!

1. W strefie ochrony bezpośredniej ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otuliny parków narodowych i rezerwatów nie wolno stosować żadnego z wymienionych preparatów .
2. Ściśle przestrzegać dawek, terminów i sposobów stosowania preparatów podanych w etykiecie na opakowaniu. Prowadzić ewidencję wykonywanych zabiegów i przechowywać ją przez okres, ca najmniej 2 lat od wykonaniu zabiegu.
3. Preparaty z grupy pyretroidów działają najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
4. Preparaty Nomolt 150 EC i A pacz 50 WG najlepiej stosować na początku wylęgu larw, pozostałe w stadium L2-L3.
5. Insektycydów Nurelle D 550 EC i Nurelle Max 515 EC nie stosować na bardzo wczesnych odmianach ziemniaka.
6. W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki ochrony roślin i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych preparatów, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu stonki. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem:
www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna >Ochrony roślin.

Kierownik Oddziału

Jarosław Matias